

この台紙は、服用の際にはよく読み、
大切に保管してください。

ビタミンB₁主薬製剤 キューピーコーワⁱプラス

第3類医薬品

△使用上の注意/ⓧしてはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)次の人は服用しないでください
妊婦又は妊娠していると思われる人。

■ **相談すること** 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この台紙を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

皮膚:発疹・発赤、かゆみ 消化器:吐き気・嘔吐、胃部不快感、胃痛 精神神経系:頭痛 その他:ほてり

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この台紙を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 軟便、下痢、口のかわき

4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この台紙を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

● **効能・効果** 1. 次の諸症状の緩和:眼精疲労、筋肉痛・関節痛(肩こり、腰痛、五十肩など)、神経痛、手足のしびれ、便秘 2. 脚気「ただし、これら1・2の症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談してください。」 3. 次の場合のビタミンB₁の補給:肉体疲労時、病中病後の体力低下時

● **用法・用量** 下記の量を水又は温湯で服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	2～3錠	1回
15歳未満の小児	ⓧ服用しないこと	

※朝・昼・晩、食前・食後にかかわらず、いつでも服用できます。
＜用法・用量に関連する注意＞用法・用量を厳守してください。

● **成分・分量** (3錠中)/ヘプロニカート100.0mg、ベンフォチアミン138.3mg〔チアミン塩化物塩酸塩(V.B₁)として100.0mg〕、オキソアミジン末60.0mg、L-アスパラギン酸マグネシウム・カリウム300.0mg、ガンマ-オリザノール

10.0mg、シアノコバラミン(V.B₁₂)60.0μg、トコフェロールコハク酸エステルカルシウム51.79mg〔dl-α-トコフェロールコハク酸エステル(V.E)として50.0mg〕

〔添加物〕ヒドロキシプロピルセルロース、セルロース、クロスポビドン、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、白糖、アクリル酸エチル・メタクリル酸メチル共重合体、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、タルク、アラビアゴム、炭酸Ca、ゼラチン、酸化チタン、カルナウバロウ

● **保管及び取扱い上の注意** (1)高温をさけ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4)水分が錠剤につくと、錠剤表面が変色したり、亀裂を生じたりすることがありますので、水滴を落としたり、ぬれた手で触れないでください。誤って錠剤をぬらした場合は、ぬれた錠剤を廃棄してください。(5)容器のキャップのしめ方が不十分な場合、湿気などにより、品質に影響を与える場合がありますので、服用のつどキャップをよくしめてください。(6)容器の落下等の衝撃により錠剤に亀裂が入り、品質に影響を与えることがありますので、取扱いに注意してください。(7)ラベルの「開封年月日」記入欄に、キャップをあけた日付を記入してください。(8)使用期限(台紙及び容器に記載)をすぎた製品は服用しないでください。また、一度キャップをあけた後は、品質保持の点から開封日より6ヵ月以内を目安に服用してください。

お問い合わせ先 興和(株)お客様相談センター
TEL 03-3279-7755
月～金(祝日を除く)9:00～17:00

副作用被害救済制度
☎0120-149-931

セルフメディケーション

税 控除 対象

D

◀開け口

Kowa

製造
販売元

興和株式会社

東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

E4K