

 **hisamitsu**®

指などの細い患部にも
くるりと巻け、ぴったり貼れる。

第3類医薬品

サロシップ®

ショートサイズ
5cm×10cm

まき ばり
巻貼®
タイプ



新・粘着力
鎮痛冷却

冷感

打撲・ねんざ・肩こり・関節痛などに

鎮痛消炎シップ剤

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要なときにすぐ読めるように大切に保管してください。

ここを
押し開けて
ください。

第3類医薬品

販売名：サロンシップ®

特長

1. こちよい冷感の鎮痛消炎シップ剤。
2. くるりと巻いて貼っても、はがれにくい。
特殊な基布なので、シップとシップを重ねて貼ってもはがれにくいです。
3. さわやかな使用感。
気温や湿度変化に強いので、ベタツキが少ないです。
4. 薬袋は、乾燥を防ぐ「保湿チャック」付。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

「守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。」

次の部位には使用しないでください。

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口。

👤 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、色素沈着

3. 5～6日間使用しても症状がよくなりない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

効能・効果

打撲、ねんざ、筋肉痛、筋肉疲労、腰痛、肩こり、関節痛、骨折痛、しもやけ

用法・用量

1日数回患部に貼付してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 患部の皮膚は清潔にして貼ってください。

成分・分量（膏体100g中）

サリチル酸グリコール …… 1.25 g
ℓ-メントール …………… 1.00 g
ビタミンE 酢酸エステル …… 1.00 g
dℓ-カンフル …………… 0.30 g

添加物として、イソプロピルメチルフェノール、エタノール、グリセリン、ケイ酸Al、香料、酸化チタン、ゼラチン、ポリアクリル酸部分中和物、ポリビニルアルコール（部分けん化物）、その他3成分を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり、品質が変わることがあります）。
- (4) 開封後はチャックをしっかり閉めて保管してください。

▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。

製造販売元  **久光製薬株式会社** 〒841-0017 鳥栖市田代大官町408番地

<http://www.hisamitsu.co.jp>

お客様相談室：☎ **0120-133250**

受付時間 / 9:00～17:50（土日・祝日・会社休日を除く）

副作用被害救済制度のお問い合わせ先：（独）医薬品医療機器総合機構

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html ☎ **0120-149-931**